

À destination
des professionnels

DÉPISTAGE DESCANCERS

Centre de coordination
Hauts-de-France

ONCO

HAUTS-DE-FRANCE
DISPOSITIF SPÉCIFIQUE
RÉGIONAL DU CANCER



Dépistage Organisé du Cancer du Col de l'Utérus

Pour qui ?

Les femmes asymptomatiques âgées de 25 à 65 ans y compris les femmes enceintes, ménopausées, vaccinées contre les infections HPV.

Population non éligible :

- Les femmes n'ayant pas ou plus de col de l'utérus,
- Les femmes ayant des signes fonctionnels ou cliniques faisant suspecter un cancer du col de l'utérus. Elles relèvent d'un examen immédiat à visée diagnostique,
- Les femmes ayant eu un traitement conservateur (cryothérapie, vaporisation laser, conisation au bistouri à froid ou au laser, résection à l'anse diathermique...) pour une lésion précancéreuse ou cancéreuse du col de l'utérus.

Sources : site e-cancer/professionnels de santé

Arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistage organisé des cancers. JORF. 2024;002129-79.

Evaluation de la recherche des HPV en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus et de la place du double immunomarquage p16/Ki67. Synthèse et recommandations HAS Juillet 2019.

Brun J.L., Bergeron C., Averous G., Ardaens K., Aynaud O., Baffet H., Bouquet S., et al. Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine anormale : actualisation des recommandations INCa après la mise en place du dépistage par le test HPV. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2025 Feb;53(2):54-75. French.

Comment ?

De 25 à 65 ans, si la patiente n'a pas encore réalisé son dépistage dans les intervalles recommandés, l'Assurance Maladie **lui met à disposition sur son compte Ameli une invitation au dépistage dématérialisée**. Relance dématérialisée à 6 mois et par courrier postal à 12 mois. En l'absence de compte Ameli, les invitations et relances sont adressées par courrier postal.

Cette invitation permet la prise en charge à 100% de l'analyse au laboratoire à condition que soit coché sur la feuille de demande d'examen "dépistage organisé (DO)". L'examen est un prélèvement cervico-utérin (frottis), **mais l'analyse effectuée au laboratoire diffère selon l'âge de la patiente** :

- entre 25 et 29 ans, c'est une **analyse cytologique** (recherche de cellules anormales). À faire 2 fois à 1 an d'intervalle puis tous les 3 ans, en l'absence d'anomalie,
- à partir de 30 ans et jusque 65 ans, **c'est le test HPV-HR** (détection de la présence de Papillomavirus à haut risque). À faire tous les 5 ans si résultat négatif,

Attention, en cas de col cliniquement anormal ou de symptomatologie clinique (métrorragies provoquées), une colposcopie doit être impérativement réalisée.

Quels Résultats ?

Les résultats, doivent être adressés par le laboratoire au préleveur/préscripteur/médecin traitant, à la patiente sous forme de résultat simplifié et au Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC), sauf opposition de la patiente.

► **Si résultat normal : cytologie normale (25-29 ans) ou HPV négatif (30 -65 ans)**, la patiente devra renouveler le test dans les délais recommandés selon sa tranche d'âge.

► **Si cytologie anormale (25-29 ans) : 3 cas de figure**

1/ cytologie ASCUS → faire test HPV de triage :

- si HPV négatif → prochain test HPV à 5ans
- si HPV positif → faire une colposcopie avec biopsie si anomalie

2/ Cytologie AGC → faire test HPV de triage :

- si HPV négatif → prochain test à 3 ans (cyto ou HPV selon l'âge)
- si HPV positif → faire une colposcopie et curetage endocervical

3/ Cytologie LSIL, ASC-H, HSIL → faire une colposcopie avec biopsie si anomalie

► **Si HPV positif (30-65 ans) → faire cytologie de triage (cytologie réflexe)**

- si cytologie réflexe normale → contrôler HPV à 1 an
- si cytologie réflexe anormale → faire une colposcopie avec biopsie si anomalie (ajouter une curetage endocervical en cas d'AGC)

Le prélèvement cervico-utérin donne l'alerte, la colposcopie localise la lésion et c'est à la biopsie qu'appartient le diagnostic.

Pour aller plus loin :

www.cancer.fr/catalogue-des-publications/conduite-a-tenir-devant-une-femme-ayant-une-cytologie-cervico-uterine-anormale-thesaurus